

Teste Ru semestrul 6

- 1 «Золотым» часом у больных с тяжелой сочетанной травмой называют:
- 2 «Кинжальная» боль в животе характерна для:
- 3 «Лицо Гиппократата» у больного с запущенным перитонитом характеризуется сочетанием следующих признаков:
- 4 «Шум плеска» при аускультации и перкуссии живота появляется вследствие:
- 5 Анаэробная клостридиальная инфекция мягких тканей (газовая гангрена) классифицируется на следующие формы:
- 6 Анаэробная неклостридиальная инфекция клинически может проявляться в виде флегмоны с обширным поражением следующих тканей:
- 7 Ассиметричное увеличение живота обычно наблюдается при:
- 8 Боль в покое при хронической ишемии нижних конечностей имеет следующие характеристики:
- 9 Больной жалуется на повторяющиеся сильные боли в икроножных мышцах, возникающие после прохождения определенной дистанции. Эти боли вынуждают больного остановиться и исчезают после кратковременного отдыха. Какой синдром следует заподозрить?
- 10 Больной жалуется на повторяющиеся сильные боли в икроножных мышцах, возникающие после прохождения определенной дистанции. Эти боли вынуждают больного остановиться и исчезают после кратковременного отдыха. Как называется данный симптом?
- 11 В зависимости от линии перелома, последние классифицируются на:
- 12 В зависимости от линии перелома, последние классифицируются на:
- 13 В зависимости от локализации выделяют следующие формы абсцесса молочной железы:
- 14 В зависимости от причины развития артериальные аневризмы подразделяют на:
- 15 В зависимости от характера ткани, выстилающей свищевой ход, выделяют следующие виды свищей:
- 16 В каких клинических ситуациях мышечное напряжение может быть значительно ослаблено, даже при наличии серьезного перитонита?
- 17 В каких случаях боль в животе имеет висцеральный характер?
- 18 В каких случаях показана госпитализация больного с фурункулом?
- 19 В какой области тела чаще развивается рожистое воспаление?
- 20 В каком периоде травматической болезни у пострадавшего может развиваться острая токсемия и септикопиемия?
- 21 В подавляющем большинстве случаев возбудителем гнойных процессов на пальцах и кисти является:

- 22 В положении больной лежа на спине с поднятыми вверх руками проводят пальпацию молочной железы всеми пальцами руки, осторожными круговыми движениями, прижимая ткань железы к грудной стенке. Эта методика носит название:
- 23 В течение первого «золотого» часа после тяжелой травмы с помощью своевременного применения лечебных мероприятий могут быть предупреждены многие летальные исходы, связанные с:
- 24 В чем заключается симптом Мельникова при анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей (газовой гангрене)?
- 25 В чем заключается хирургическое лечение кожного панариция?
- 26 В чем состоит положительный симптом «Ваньки-встаньки»?
- 27 Вегетативная диабетическая нейропатия приводит к:
- 28 Влажная гангрена характеризуется следующими признаками:
- 29 Внедрение патогенной микрофлоры в мягкие ткани кистей рук чаще всего происходит:
- 30 Возможные срочные хирургические мероприятия при гемотораксе включают:
- 31 Выберите два правильных варианта определения псоас-симптома, который выявляется при абдоминальных воспалениях?
- 32 Выберите правильные утверждения относительно метода VAC (Vacuum Assisted Closure) и его использования при диабетической стопе.
- 33 Выберите утверждения, характеризующие правильную технику выполнения теста Симмс-Вейнштейна.
- 34 Выберите утверждения, характеризующие правильную технику выполнения теста Симмс-Вейнштейна.
- 35 Вывих считается острым в течение первых:
- 36 Вынужденная ампутация пальца наиболее часто бывает необходимой при:
- 37 Выполнение аускультации у хирургического больного позволяет определить:
- 38 Выполнение перкуссии у хирургического больного позволяет определить:
- 39 Выявление прослоек газа в мягких тканях при анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей (газовой гангрене) при проведении рентгенологического исследования или компьютерной томографии называют также:
- 40 Где изначально локализуется боль в животе, обусловленная патологией тонкого кишечника?
- 41 Гидраденит характеризуется следующими признаками:
- 42 Гипогастральная область живота включает:
- 43 Глубокая инфекция при диабетической стопе поражает:
- 44 Гнойное воспаление потовых желез называют:

- 45 Группа симптомов, объединяемых в англоязычной литературе термином «бР», характерна для:
- 46 Диагноз «острый живот» служит:
- 47 Длительность периода реконвалесценции при травматической болезни составляет:
- 48 Для влажной гангрены конечности характерны следующие клинические симптомы:
- 49 Для диагностики синдрома системного воспалительного ответа (SIRS) используют следующие критерии:
- 50 Для заболеваний каких органов живота характерна иррадиация боли в середину крестца?
- 51 Для ишемической формы диабетической стопы характерно:
- 52 Для каких заболеваний характерно постепенное нарастание интенсивности болевого синдрома в животе?
- 53 Для какой патологии характерен симптом «Ваньки-встаньки»?
- 54 Для нейропатической формы диабетической стопы характерно:
- 55 Для подтверждения ишемической формы диабетической стопы применяют:
- 56 Для поздних стадий острой ишемии конечности характерны следующие клинические данные:
- 57 Для ракового поражения молочной железы характерно:
- 58 Для синдрома хронической венозной недостаточности нижних конечностей не характерны следующие симптомы:
- 59 Для удобства описания симптомов живот разделяют на:
- 60 Если есть подозрение на образование в молочной железе, а центральные подмышечные лимфатические узлы при пальпации большие, твердые и болезненные, следует определить следующие группы лимфоузлов:
- 61 Жажда и сухость во рту у больного с «острым животом» являются признаком:
- 62 Забор каких донорских органов и тканей может быть осуществлен от живого донора?
- 63 Злокачественные опухоли молочной железы метастазируют в:
- 64 Иррадиация боли в надключичную область на стороне поражения встречается при:
- 65 Иррадиация боли в область нижнего угла правой лопатки характерна для:
- 66 Искусственно созданное сообщение между полым органом и внешней средой называют:
- 67 Использование не органических или синтетических материалов для замещения тканей и органов человека называют:
- 68 К вероятным признакам переломов относят:
- 69 К воспалительным заболеваниям молочной железы относятся:

- 70 К врожденным аномалиям молочной железы относятся:
- 71 К дисгормональным заболеваниям молочной железы относятся:
- 72 К достоверным признакам переломов относят:
- 73 К множественной травме относится:
- 74 К симптомам «втяжения» при опухолях молочной железы относятся:
- 75 К симптомам травматического разрыва дуги аорты относятся:
- 76 Как называется симптом при мастопатии, при котором пальпируемое в вертикальном положении больной уплотнение в молочной железе, исчезает при пальпации в горизонтальном положении?
- 77 Как называют различие диаметра зрачков вследствие черепно-мозговой травмы?
- 78 Как называются отделы, на которые условно разделяют молочную железу?
- 79 Как определяется положительный симптом Блюмберга при перитоните?
- 80 Как правильно определять место наибольшей болезненности и, следовательно, локализацию гнойного очага при подкожном панариции?
- 81 Как правильно проводить антибиотикотерапию при поступлении больного с тяжелой хирургической инфекцией?
- 82 Какая гематома при черепно-мозговой травме не приводит к сдавлению мозга?
- 83 Какая температура обычно отмечается у больных с острым аппендицитом на момент обращения за медицинской помощью?
- 84 Какая травма называется множественной?
- 85 Какая травма называется сочетанной?
- 86 Какая форма панариция наиболее вероятна, если на ладонной поверхности пальца кисти определяется небольшой пузырь, заполненный гнойным содержимым?
- 87 Какая форма столбняка наименее опасна?
- 88 Какая экстренная лечебная мера показана при напряженном пневмотораксе?
- 89 Какие биологические эффекты вызывает альфа-экзотоксин *Clostridium perfringens*?
- 90 Какие варианты боли характерны для острых хирургических заболеваний живота?
- 91 Какие донорские органы и ткани могут быть забраны только у трупа?
- 92 Какие заболевания не сопровождаются внутрибрюшным кровотечением?
- 93 Какие заболевания не характерны для детского возраста?
- 94 Какие заболевания относятся к аномалиям развития молочной железы?
- 95 Какие заболевания сопровождаются внутрибрюшным кровотечением?
- 96 Какие заболевания сопровождаются перфорацией полого органа в брюшную полость?

- 97 Какие заболевания характерны для больных среднего возраста?
- 98 Какие заболевания характерны для больных среднего возраста?
- 99 Какие заболевания, обуславливающие клиническую картину «острого живота», относятся к синдрому «острой кишечной непроходимости»?
- 100 Какие из заболеваний, обуславливающих клиническую картину «острого живота», не относятся к воспалительным?
- 101 Какие из заболеваний, обуславливающих клиническую картину «острого живота», имеют воспалительный характер?
- 102 Какие из перечисленных причин травматических повреждений пищевода относятся к ятрогенным?
- 103 Какие из перечисленных свищей относятся к врожденным?
- 104 Какие из перечисленных свищей относятся к приобретенным?
- 105 Какие из перечисленных симптомов свидетельствуют о сдавлении мозга постравматической гематомой?
- 106 Какие из перечисленных ситуаций не относятся к перфорации полого органа в брюшную полость?
- 107 Какие из перечисленных факторов вызывают некроз тканей опосредованно?
- 108 Какие из перечисленных факторов не влияют на развитие «циркуляторных» некрозов?
- 109 Какие из перечисленных факторов непосредственно вызывают некроз тканей?
- 110 Какие из признаков относятся к общемозговым симптомам при черепно-мозговой травме?
- 111 Какие из признаков относятся к очаговым симптомам при черепно-мозговой травме?
- 112 Какие из указанных повреждений относятся к изолированной травме?
- 113 Какие из указанных повреждений относятся к множественной травме?
- 114 Какие из указанных повреждений относятся к сочетанной травме?
- 115 Какие из утверждений, относящихся к абсцессу, являются верными?
- 116 Какие из утверждений, относящихся к флегмоне, являются верными?
- 117 Какие инструментальные и лабораторные исследования наиболее информативны для подтверждения диагноза анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей (газовой гангрены)?
- 118 Какие инфекционные процессы относятся к острой специфической хирургической инфекции?
- 119 Какие клинические признаки гемоторакса не встречаются при пневмотораксе?
- 120 Какие клинические признаки сходны при гемотораксе и пневмотораксе?

- 121 Какие клинические синдромы выделяют при травме живота с повреждением внутренних органов?
- 122 Какие клинические феномены характерны для сепсиса?
- 123 Какие компоненты включает окончательный клинический диагноз?
- 124 Какие лейкоциты обеспечивают гуморальный иммунный ответ на хирургическую инфекцию?
- 125 Какие местные симптомы могут свидетельствовать о тяжелой черепно-мозговой травме (например, переломе костей основания черепа)?
- 126 Какие механизмы ответной реакции человеческого организма на инфекцию относятся к неспецифическим?
- 127 Какие острые хирургические заболевания органов брюшной полости сопровождаются многократной рвотой?
- 128 Какие параметры используют для определения уровня сознания по шкале Глазго при черепно-мозговой травме?
- 129 Какие патофизиологические механизмы способствуют развитию ишемии и создают анаэробные условия при анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей (газовой гангрене)?
- 130 Какие переломы считают осложненными:
- 131 Какие периоды выделяют в течение травматической болезни?
- 132 Какие положения правильно характеризуют столбняк?
- 133 Какие признаки отличают напряженный (клапанный) пневмоторакс от закрытого (обычного) пневмоторакса?
- 134 Какие признаки отмечают при визуальном осмотре молочной железы?
- 135 Какие признаки характеризуют флотирующие переломы ребер?
- 136 Какие разрезы выполняют при сухожильном панариции?
- 137 Какие свойства микроорганизмов определяют эволюцию хирургической инфекции?
- 138 Какие симптомы всегда определяются при переломе ребер?
- 139 Какие симптомы характерны для генерализованной формы столбняка?
- 140 Какие симптомы характерны для повреждения трахеи и крупных бронхов?
- 141 Какие системные эффекты вызывают цитокины при хирургическом сепсисе?
- 142 Какие существуют классификации сепсиса?
- 143 Какие факторы играют основную роль в биомеханике закрытой травмы?
- 144 Какие фундаментальные открытия легли в основу развития трансплантологии?
- 145 Какие характеристики обязательны при описании объемного образования молочной железы?

- 146 Какие характеристики обязательны при описании объемного образования молочной железы?
- 147 Какие цели преследует поверхностная пальпация живота?
- 148 Какие черепно-мозговые повреждения приводят к появлению как общемозговой, так и очаговой симптоматики?
- 149 Какие черепно-мозговые повреждения приводят к появлению только общемозговой симптоматики?
- 150 Какие экстраабдоминальные заболевания могут сопровождаться мышечным сопротивлением передней стенки живота?
- 151 Какие экстраабдоминальные заболевания способны вызывать клиническую картину «острого живота»?
- 152 Какие эффекты оказывает гипергликемия при сахарном диабете на иммунную систему?
- 153 Каков механизм воздействия травматического агента при открытом переломе конечности, когда фрагмент сломанной кости ранит мягкие ткани?
- 154 Каков механизм феномена бактериальной транслокации, приводящей к сепсису и полиорганной недостаточности?
- 155 Каков наиболее частый источник возникновения столбняка?
- 156 Каков оптимальный метод лечения при внутримозговых гематомах?
- 157 Каков характер висцеральной боли при «остром животе»?
- 158 Каков характер рвоты при остром аппендиците?
- 159 Каков характер соматической боли при «остром животе»?
- 160 Какова основная цель обследования больного с травмой живота
- 161 Какова роль мононуклеарных фагоцитов в очаге воспаления?
- 162 Какова цель «лампасных» разрезов при анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей (газовой гангрене) конечности?
- 163 Какова цель осмотра молочных желез в положении женщины сидя, с руками на поясе?
- 164 Какова цель пальпации молочных желез?
- 165 Какова цель пальпации молочных желез?
- 166 Каково должно быть положение больного при пальпации живота?
- 167 Каково определение «тяжелого сепсиса»?
- 168 Каковы гистопатологические особенности анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей (газовой гангрены)?
- 169 Каковы клинические проявления флотирующих переломов ребер?

- 170 Каковы наиболее вероятные причины болезни у пациента, у которого начало боли в животе сопровождается температурой 40-41 °C?
- 171 Каковы основные механизмы развития полиорганной недостаточности при сепсисе?
- 172 Каковы правила дренирования гнойного очага при паронихии?
- 173 Каковы правила дренирования гнойного очага при подкожном панариции?
- 174 Каковы правила дренирования гнойного очага при сухожильном панариции?
- 175 Каковы типичные клинические проявления анаэробной неклостридиальной инфекции мягких тканей?
- 176 Какое заболевание сопровождается «кинжальной» болью в животе?
- 177 Какое из заболеваний типично для больных старше 60 лет?
- 178 Какое из заболеваний характерно для детей?
- 179 Какое количество смертей, вызванных травмой, происходит в течение второго пика летальности (в первые часы после травмы)?
- 180 Какое лечение рекомендуется, если простой пневмоторакс достаточно большой, чтобы быть видимым на обзорной радиограмме?
- 181 Какое расположение гнойника определяется, как панариций?
- 182 Какое сочетание признаков характеризует «лицо Гиппократата» у больного с запущенным перитонитом?
- 183 Какой дополнительный метод обследования используют для скрининга с целью раннего выявления рака молочной железы?
- 184 Какой из перечисленных результатов параклинических исследований является решающим для подтверждения сепсиса?
- 185 Какой из указанных вариантов пересадки органа относится к аллогенной трансплантации?
- 186 Какой из указанных вариантов пересадки органа относится к ксеногенной трансплантации?
- 187 Какой из указанных вариантов пересадки органа относится к сингенной трансплантации?
- 188 Какой из указанных видов трансплантации называют гетеротопическим?
- 189 Какой из указанных видов трансплантации называют ортотопическим?
- 190 Какой из указанных дополнительных методов лечения является наилучшим при анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей (газовой гангрене)?
- 191 Какой патологический признак может быть установлен и при осмотре и при пальпации молочной железы?
- 192 Какой показатель наиболее точно отражает степень метаболической компенсации при сахарном диабете II типа?

- 193 Какой симптом достоверно указывает на то, что фурункул находится в фазе абсцедирования?
- 194 Какой симптом не встречается при сотрясении мозга?
- 195 Карбункул характеризуется следующими признаками:
- 196 Клапанный пневмоторакс также называется:
- 197 Клиническая картина мастопатии включает следующие признаки:
- 198 Когда следует проводить профилактический осмотр молочных желез?
- 199 Комплексное лечение больных с анаэробной неклостридиальной инфекцией предусматривает:
- 200 Комплексное лечение нейропатической формы диабетической стопы, третья степень по классификации Вагнера, включает:
- 201 Комплексное хирургическое лечение ишемической формы диабетической стопы, четвертая степень по классификации Вагнера, включает:
- 202 Консервативное лечение больного с фурункулом, осложненным тромбозом кавернозного синуса, обязательно должно включать:
- 203 Контакт зонда с костью при ревизии трофической язвы на диабетической стопе свидетельствует о высокой вероятности диагноза:
- 204 Критическим уровнем давления на подошвенную поверхность стопы, приводящим к развитию язвы при сахарном диабете является:
- 205 Лимфедема конечностей классифицируется на:
- 206 Мезогастральная область живота включает:
- 207 Методом выбора в диагностике остеомиелита при диабетической стопе является:
- 208 Методом выбора при лечении идиопатической гинекомастии является:
- 209 Механизмы вторичного повреждения мозга при травме включают:
- 210 Механизмы первичного повреждения мозга при травме включают:
- 211 Многократная рвота с примесью желчи типична для:
- 212 Мышечное напряжение у пациентов с «острым животом» развивается вследствие:
- 213 На основании каких данных устанавливают клинический диагноз?
- 214 На основании каких данных устанавливают предварительный диагноз?
- 215 На основании каких признаков диагностируют открытый пневмоторакс?
- 216 На чем базируется параклиническая диагностика столбняка?
- 217 На чем основывается клиническая диагностика тяжелого сепсиса?
- 218 На чем основывается лабораторная диагностика тяжелого сепсиса?
- 219 Наиболее часто ампутации нижних конечностей выполняются у:

- 220 Наиболее частым возбудителем газовой гангрены является:
- 221 Наличие костных секвестров при воспалении пальцев кисти отмечается при:
- 222 Наличие свободной жидкости в брюшной полости клинически определяется при помощи:
- 223 Нарушения чувствительности (парестезии, гипо- или анестезия) и активных движений (парез, паралич) характерны для:
- 224 Начало какого заболевания обычно связано с поднятием тяжести или резким изменением положения тела?
- 225 Некроз сухожилия при гнойном тендовагините возникает вследствие:
- 226 Непуэрпиральная галакторрея характеризуется следующими признаками:
- 227 О чем свидетельствует симптом флюктуации при хирургической инфекции мягких тканей?
- 228 О чем свидетельствует тимпанический звук при перкуссии грудной клетки в случае травмы?
- 229 Образование газа в мягких тканях представляет характерную особенность следующих видов инфекции:
- 230 Образование мозоли на подошвенной поверхности диабетической стопы приводит к:
- 231 Одностороннее втяжение соска обычно является признаком:
- 232 Одностороннее притупление перкуторного звука в сочетании с появлением перистальтических шумов в грудной клетке на стороне поражения выявляется при:
- 233 Оказание первой помощи при открытом переломе не предусматривает
- 234 Опоясывающий характер болей в животе характерен для:
- 235 Определяемая пальпаторно крепитация при анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей связана с:
- 236 Опухоль молочной железы прорастает в грудную фасцию, если при пальпации:
- 237 Опухоль молочной железы прорастает в ребра и межреберные мышцы, если при пальпации:
- 238 Осмотр молочных желез проводится в следующих положениях больной:
- 239 Основная опасность тромбоза большой подкожной вены бедра заключается в:
- 240 Основные причины гинекомастии следующие:
- 241 От чего зависит неврологическая симптоматика при внутримозговых гематомах?
- 242 Отек конечности при проксимальном (илиофemorальном) тромбозе глубоких вен имеет следующие характеристики:
- 243 Отек конечности при синдроме острой ишемии имеет следующие характеристики:

- 244 Отек конечности при хронической венозной недостаточности имеет следующие характеристики:
- 245 Отек тыла кисти при флегмоне ее ладонной поверхности:
- 246 Отсутствие стула и отхождения газов является ранним симптомом при:
- 247 Пальпацию пульса на бедренной артерии осуществляют в:
- 248 Пальпацию пульса на плечевой артерии осуществляют в:
- 249 Пальпацию пульса на подколенной артерии осуществляют:
- 250 Пальпация живота начинается с:
- 251 Пальпация молочной железы иногда позволяет выявить образование с типичным расположением непосредственно под ареолой, которое носит название:
- 252 Пальпация молочной железы по методу Вельпо проводится по следующим правилам:
- 253 Парапроктитом называют:
- 254 Паронихией называют локализацию гнойного очага:
- 255 Патогенетическая классификация диабетической стопы предусматривает выделение следующих форм:
- 256 Патологический перелом может быть обусловлен:
- 257 Патологическое сообщение между двумя полыми органами называют:
- 258 Патологическое сообщение между полым органом и внешней средой называют:
- 259 Первая медицинская помощь при переломе включает:
- 260 Первичный осмотр больного с варикозной болезнью нижних конечностей следует производить в положении больного:
- 261 Перечислите симптомы, составляющие триаду Бека при тампонаде сердца.
- 262 Период тепловой ишемии при трансплантации органов начинается:
- 263 Перистальтику кишечника следует выслушивать в:
- 264 По классификации Вагнера, второй степени поражения тканей при диабетической стопе соответствует:
- 265 По классификации Вагнера, нулевой степени поражения тканей при диабетической стопе соответствует:
- 266 По классификации Вагнера, первой степени поражения тканей при диабетической стопе соответствует:
- 267 По классификации Вагнера, пятой степени поражения тканей при диабетической стопе соответствует:
- 268 По классификации Вагнера, третьей степени поражения тканей при диабетической стопе соответствует:

- 269 По классификации Вагнера, четвертой степени поражения тканей при диабетической стопе соответствует:
- 270 По характеру повреждающего агента выделяют следующие виды травмы:
- 271 Поверхностная инфекция при диабетической стопе поражает:
- 272 Повышенный риск развития сепсиса отмечается у:
- 273 Под термином «кататравма» подразумевается:
- 274 Под термином ятрогенная травма подразумевается:
- 275 Подкожная эмфизема в случае травмы грудной клетки свидетельствует:
- 276 Положительный посев крови при сепсисе с выделением *Bacteroides fragilis* свидетельствуют, что источник инфекции, скорее всего, располагается:
- 277 После забора органов для трансплантации, наибольшее время в условиях холодовой ишемии вне организма может находиться:
- 278 Послеоперационная профилактика отторжения трансплантированного органа заключается:
- 279 Послеродовой мастит также называют:
- 280 Постоянный (систолический) шум над магистральными артериями выслушивается в случае:
- 281 Появление резкой боли в икроножной мышце при пассивном тыльном сгибании стопы определяют в семиологии сосудов как положительный симптом:
- 282 Правила самообследования молочных желез следующие:
- 283 Правильная последовательность при осмотре молочных желез следующая:
- 284 При анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей (газовой гангрене) пораженные мышцы:
- 285 При артериовенозной фистуле пальпаторно можно определить следующие симптомы:
- 286 При висцеральной боли раздражение от органов желудочно-кишечного тракта проводится по:
- 287 При выборе способа хирургического лечения диабетической стопы наибольшее значение имеет:
- 288 При выслушивании систолического шума в подколенной ямке следует заподозрить:
- 289 При гидрадените гнойное воспаление развивается в:
- 290 При каких заболеваниях можно выявить усиление боли в животе при глубоком вдохе?
- 291 При каких заболеваниях органов брюшной полости пациенты могут указать время начало заболевания с точностью до минут?

- 292 При каких заболеваниях органов брюшной полости при перкуссии живота можно обнаружить диффузное притупление перкуторного звука?
- 293 При каких заболеваниях при осмотре отмечается гиперемия кожи молочной железы?
- 294 При каких острых заболеваниях брюшной полости температура тела пациента может быть понижена (до 35-36°C)?
- 295 При каких острых заболеваниях живота у больных часто отмечается желтушность кожных покровов?
- 296 При каких острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости особенно характерны жажда и сухость во рту?
- 297 При каких острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости может быть обнаружено исчезновение печеночной тупости?
- 298 При каких острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости рвота не характерна?
- 299 При каких острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости рвота не характерна?
- 300 При каких ситуациях боль при нанесении раны может быть значительно снижена или отсутствовать?
- 301 При каких сопутствующих заболеваниях следует заподозрить эмболию, как причину острой ишемии нижней конечности?
- 302 При каких типах трансплантации не развивается реакция отторжения?
- 303 При каких формах рожистого воспаления показано хирургическое лечение?
- 304 При какой патологии интенсивность болей настолько высока, что больной не находит себе места?
- 305 При какой патологии мышечное напряжение передней брюшной стенки не характерно?
- 306 При какой патологии мышечное напряжение передней брюшной стенки настолько сильное, постоянное и распространенное, что определяется как «доскообразный живот»?
- 307 При каком заболевании аускультативно может определяться громкая усиленная перистальтика кишечника?
- 308 При каком заболевании встречается «фекалоидная» («каловая») рвота?
- 309 При каком заболевании кишечная перистальтика при аускультации отсутствует?
- 310 При каком минимальном уровне давления на мягкие ткани превышает давление наполнения капилляров, что приводит к ишемии и некрозу тканей и образованию пролежней?
- 311 При каком переломе вероятность инфицирования кости наиболее высока?
- 312 При мастопатии в молочной железе происходит:

- 313 При наличии гнойных выделений из сосков следует заподозрить:
- 314 При наличии кровянистых выделений из сосков следует заподозрить:
- 315 При обширной ране живота с выпадением внутренних органов первая медицинская помощь заключается в:
- 316 При оценке симптома Бранхама результат считают положительным если:
- 317 При соматической боли раздражение от органов желудочно-кишечного тракта проводится по:
- 318 При сформировавшейся гнойной полости, в отличие от инфильтративной фазы воспаления, выявляют следующие симптомы:
- 319 При травматических повреждениях пищевода выявляют следующие симптомы:
- 320 При фурункуле гнойное воспаление развивается в:
- 321 При хирургическом лечении панариция наиболее часто для дренирования ран используют:
- 322 Приблизительно у 10% здоровых людей невозможно пальпировать пульс на:
- 323 Примерно половина всех смертей случается в течение первых секунд или минут после травмы и обусловлены:
- 324 Притупление перкуторного звука над грудной клеткой при травме свидетельствует о:
- 325 Продолжительность антибиотикотерапии остеомиелита при диабетической стопе обычно составляет:
- 326 Пролежень, при котором выявляется повреждение кожи на всю толщину с распространением на подкожную клетчатку, но не через мышечную фасцию, классифицируется как:
- 327 Пролежни типично локализуются на:
- 328 Прямым показанием к хирургическому вмешательству при подозрении на абсцесс мягких тканей служат:
- 329 Пульсирующий характер боли при хирургической инфекции мягких тканей характерен для:
- 330 Пуэрипальный мастит развивается:
- 331 Радикальная хирургическая операция при копчиковом абсцессе заключается:
- 332 Развитию копчикового абсцесса способствует скопление в полости копчиковой кисты:
- 333 Различают следующие виды переломов костей черепа:
- 334 Разрез по Клаппу (дугообразный, параллельно краю ногтя) применяют при лечении:
- 335 Рак грудной железы у мужчин:

- 336 Рвота у больных с «острым животом» обусловлена:
- 337 Резкое усиление боли при перкуссии вдоль оси пальца особенно характерно для:
- 338 Рентгенологические изменения при костном панариции появляются:
- 339 С какой области следует начинать поверхностную пальпацию живота?
- 340 С целью выявления группы риска по диабетической стопе (скрининга) больным сахарным диабетом выполняют:
- 341 С целью клинической диагностики патологического венозного рефлюкса при варикозной болезни в бассейне большой подкожной вены бедра применяют:
- 342 С целью клинической диагностики проходимости глубоких вен нижней конечности перед операцией по поводу варикозной болезни применяют:
- 343 С целью транспортной иммобилизации при переломах применяют:
- 344 Симметричное увеличение живота обычно бывает при:
- 345 Симптом Бюргера-Рэтшоу при синдроме хронической ишемии включает следующие моменты:
- 346 Симптомы рака грудной железы у мужчин следующие:
- 347 Синдром «ишемии конечностей» подразделяется на:
- 348 Синдром хронической венозной недостаточности нижних конечностей характеризуется следующими местными симптомами:
- 349 Синяя флегмазия (*phlegmasia cerulea dolens*) является:
- 350 Систолический шум над магистральными артериями выслушивается в случае:
- 351 Систолический шум при аневризме брюшной аорты следует выслушивать в:
- 352 Сквозное дренирование через небольшие разрезы на ладонной и тыльной поверхности кисти в области межпальцевых складок применяется в лечении:
- 353 Смещение болей из эпигастральной в правую подвздошную область указывает на:
- 354 Согласно какому принципу переломы костей подразделяют на открытые и закрытые?
- 355 Согласно классификации Вагнера, гангрена пальцев стопы, оценивается как поражение:
- 356 Согласно классификации Вагнера, глубокая язва стопы, прободающая подкожную клетчатку и не осложненная остеомиелитом или абсцессом, оценивается как поражение:
- 357 Согласно классификации Вагнера, глубокая язва стопы, прободающая подкожную клетчатку и осложненная остеомиелитом, абсцессом или флегмоной, оценивается как поражение:
- 358 Согласно классификации Вагнера, поверхностная язва стопы, не прободающая подкожную клетчатку, оценивается как поражение:

- 359 Согласно классификации Вагнера, распространенная гангрена стопы, оценивается как поражение:
- 360 Согласно классификации хирургической инфекции по эволюции заболевания, столбняк относится к:
- 361 Согласно классификации хирургической инфекции по эволюции заболевания, туберкулез относится к:
- 362 Согласно международной классификации, инфекция диабетической стопы сочетающаяся с ССВР, оценивается как инфекция:
- 363 Созданное хирургическим путем искусственное сообщение между двумя полыми органами называют:
- 364 Соматическая диабетическая нейропатия приводит к:
- 365 Сочетание каких показателей соответствует наличию у больного синдрома системного воспалительного ответа (SIRS)?
- 366 Сочетание каких признаков позволяет клинически установить перелом ребер?
- 367 Сочетание каких трех симптомов объединяются в триаду Бека при травматической тампонаде сердца?
- 368 Спастические боли в животе характерны для:
- 369 Спонтанная анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей (газовая гангрена) чаще развивается у больных:
- 370 Сухая гангрена характеризуется следующими признаками:
- 371 Сухожильный панариций каких пальцев кисти может привести к распространению инфекции в клетчаточное пространство предплечья Пирогова-Парона?
- 372 Термин «аневризма артерии» означает:
- 373 Термин «ишемия конечности» означает:
- 374 Термин «острый живот» это:
- 375 Термином «пандактилит» обозначают:
- 376 Типичной локализацией гидраденита является:
- 377 Типичным возбудителем рожистого воспаления является:
- 378 Тромбоз кавернозного синуса является редким, но очень тяжелым (и часто фатальным) осложнением фурункула при его расположении:
- 379 Тромбоз подкожных вен при варикозной болезни (варикотромбофлебит) характеризуется следующими местными симптомами:
- 380 Тромбоэмболия периферических артерий сопровождается развитием синдрома:
- 381 У больных с опухолью головки поджелудочной железы может быть выявлен симптом Курвуазье, представляющий собой:
- 382 Увеличение в размерах грудной железы у мужчин называется:

- 383 Укажите анатомические особенности пальцев и кисти, которые обуславливают характерное проявление воспалительного процесса.
- 384 Укажите анатомические формы глубокой флегмоны ладонной поверхности кисти.
- 385 Укажите анатомические формы флегмоны тыльной поверхности кисти.
- 386 Укажите антигены тканевой совместимости, ответственные за реакцию отторжения при трансплантации органов и тканей у человека.
- 387 Укажите артерии, аускультация которых не имеет клинического значения при синдроме ишемии нижних конечностей.
- 388 Укажите верное сочетание классических признаков Канавеля, описанных при сухожильном панариции.
- 389 Укажите верные положения, относящиеся к перелому грудины.
- 390 Укажите возбудителей анаэробной неклостридиальной инфекции мягких тканей.
- 391 Укажите возможные варианты лечения больных, обратившихся с «острым животом».
- 392 Укажите возможные источники хирургической инфекции.
- 393 Укажите возможные причины развития острой артериальной недостаточности конечностей.
- 394 Укажите глубокие формы панариция.
- 395 Укажите данные анамнеза жизни, имеющие значение в диагностике вторичной лимфедемы конечностей.
- 396 Укажите данные анамнеза жизни, имеющие значение в диагностике синдрома ишемии конечностей.
- 397 Укажите дополнительные методы обследования при подозрении на заболевания молочной железы.
- 398 Укажите дополнительные не хирургические методы лечения анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей.
- 399 Укажите заболевания, проявляющиеся синдромом хронической венозной недостаточности конечностей.
- 400 Укажите изменения в лабораторных анализах, характерные для инфицированной диабетической стопы.
- 401 Укажите классификации диабетической стопы.
- 402 Укажите клинические признаки смерти мозга, которые оценивают для возможной трансплантации органов.
- 403 Укажите клинические симптомы, указывающие на инфекцию диабетической стопы четвертой степени по международной классификации.
- 404 Укажите клинические симптомы, характерные для эритематозной формы рожи.

- 405 Укажите клинические ситуации, соответствующие определению синдрома диабетической стопы по ВОЗ.
- 406 Укажите клинические формы рожистого воспаления.
- 407 Укажите компоненты триады Вирхова, составляющей патогенетический механизм сосудистого тромбоза.
- 408 Укажите медикаментозные препараты используемые для лечения и профилактики сосудистых осложнений у больных с синдромом диабетической стопы:
- 409 Укажите методы визуализации магистральных сосудов, применяющиеся в комплексном обследовании больных с ишемической формой диабетической стопы:
- 410 Укажите методы, помогающие диагностировать анаэробную неклостридиальную инфекцию мягких тканей.
- 411 Укажите механизм развития боли при гнойной хирургической инфекции мягких тканей.
- 412 Укажите механизм развития гиперемии кожных покровов при гнойной хирургической инфекции мягких тканей.
- 413 Укажите механизм развития гипертермии кожных покровов при гнойной хирургической инфекции мягких тканей.
- 414 Укажите механизм развития отека при гнойной хирургической инфекции мягких тканей.
- 415 Укажите наиболее легкую форму повреждения мозга.
- 416 Укажите наиболее часто встречающуюся форму диабетической стопы.
- 417 Укажите наиболее частое осложнение открытых переломов.
- 418 Укажите наиболее частую причину развития хронической артериальной недостаточности конечностей.
- 419 Укажите наружные свищи.
- 420 Укажите некоторые факторы риска рака молочной железы у женщин.
- 421 Укажите необходимые лечебные мероприятия у больного со столбняком.
- 422 Укажите области тела, на которых не образуются фурункулы.
- 423 Укажите оптимальное положение больной при пальпации центральных подмышечных лимфатических узлов.
- 424 Укажите оптимальный способ обезболивания для лечения кожной формы панариция.
- 425 Укажите органы, в которых может развиваться гангрена.
- 426 Укажите органы, в которых развитие некроза называют инфарктом.
- 427 Укажите основные причины появления пролежней.

- 428 Укажите параклинические методы, использующиеся в диагностике острой хирургической инфекции мягких тканей:
- 429 Укажите патогенетические механизмы хронической венозной недостаточности.
- 430 Укажите поверхностные формы панариция.
- 431 Укажите правила назначения антибиотикотерапии при сепсисе.
- 432 Укажите правила хирургического лечения карбункула.
- 433 Укажите правильное положение больного при пальпации живота.
- 434 Укажите правильную классификацию столбняка.
- 435 Укажите правильные утверждения относительно «запретной зоны» кисти.
- 436 Укажите правильные утверждения, относящиеся к оказанию первой помощи при вывихах:
- 437 Укажите признаки, не относящиеся к группе симптомов объединяемых в англоязычной литературе термином «БР».
- 438 Укажите примеры патологических синдромов.
- 439 Укажите примеры патологических синдромов.
- 440 Укажите принципы консервативного лечения пролежней.
- 441 Укажите причину острой реакции отторжения трансплантированного органа.
- 442 Укажите причину хронической реакции отторжения трансплантированного органа.
- 443 Укажите причины особенно выраженного болевого синдрома при панариции, не сравнимого с болями при гнойных заболеваниях другой локализации.
- 444 Укажите причины развития трофических язв.
- 445 Укажите причины сверхострой реакции отторжения трансплантированного органа.
- 446 Укажите причины увеличения частоты сепсиса в настоящее время.
- 447 Укажите профилактические мероприятия при столбняке.
- 448 Укажите раны с высоким риском возникновения анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей (газовой гангрены).
- 449 Укажите симптомы, отмечающиеся при тромбозе глубоких вен нижних конечностей.
- 450 Укажите синонимы «мастопатии».
- 451 Укажите составные компоненты лечения костного панариция.
- 452 Укажите специфические клинические симптомы анаэробной клостридиальной инфекции (газовой гангрены) мягких тканей.
- 453 Укажите стандартные типы вправления (репозиции) костных отломков при переломе.

- 454 Укажите термины – синонимы анаэробной клостридиальной инфекции мягких тканей.
- 455 Укажите типичную локализацию трофической язвы при синдроме хронической ишемии.
- 456 Укажите типичные осложнения артериальных аневризм.
- 457 Укажите типичные положения в постели больного с тяжелой (критической) ишемией нижней конечности.
- 458 Укажите типичные симптомы острого мастита.
- 459 Укажите типичные симптомы острой ишемии нижней конечности.
- 460 Укажите типы иммобилизации применяющиеся для окончательного (до сращения) лечения переломов.
- 461 Укажите типы реакции отторжения пересаженного органа, встречающиеся в трансплантологии.
- 462 Укажите три цитокина, имеющие основное значение в патогенезе сепсиса.
- 463 Укажите триаду Бека при тампонаде сердца.
- 464 Укажите фазы заживления (сращения) переломов.
- 465 Укажите фазы развития фурункула.
- 466 Укажите форму диабетической стопы чаще всего приводящую к высокой ампутации.
- 467 Укажите формы парапроктита.
- 468 Укажите характерные изменения в общем анализе крови при острой хирургической инфекции.
- 469 Укажите целевое значение уровня HbA1C у больных с диабетической стопой?
- 470 Укажите, какой микробный агент реже всего вызывает сепсис.
- 471 Укажите, что относится к симптомам.
- 472 Укажите, что относится к симптомам.
- 473 Успешную пересадку почки от живого донора впервые выполнил:
- 474 Фаза заживления и рубцевания в эволюции фурункула наступает после:
- 475 Центральные подмышечные лимфатические узлы расположены:
- 476 Чем проявляется односторонний гемипарез при черепно-мозговой травме?
- 477 Чем проявляется односторонняя гемиплегия при черепно-мозговой травме?
- 478 Чем характеризуется аберрантная (добавочная) молочная железа?
- 479 Чем характеризуется гангрена?
- 480 Чем характеризуется местная форма столбняка?

- 481 Чем характеризуется напряженный пневмоторакс?
- 482 Чем характеризуется открытый пневмоторакс?
- 483 Чем характеризуется период поздних нарушений в течение травматической болезни?
- 484 Чем характеризуется период ранних проявлений в течение травматической болезни?
- 485 Чем характеризуется период травматического шока в течение травматической болезни?
- 486 Что верно характеризует вросший ноготь?
- 487 Что верно характеризует кожный панариций?
- 488 Что верно характеризует копчиковый абсцесс?
- 489 Что верно характеризует костный панариций?
- 490 Что верно характеризует лимфангит?
- 491 Что верно характеризует начальные клинические проявления столбняка?
- 492 Что верно характеризует околоногтевой панариций (паронихию)?
- 493 Что верно характеризует подкожный панариций?
- 494 Что верно характеризует полителию?
- 495 Что верно характеризует сухожильный панариций?
- 496 Что верно характеризует феномен «парадоксального» дыхания при флотирующем переломе ребер?
- 497 Что верно характеризует хирургическое лечение первичного гнойного очага при сепсисе мягких тканей?
- 498 Что верно характеризует эризепилоид?
- 499 Что из перечисленного является некрозом?
- 500 Что отличает абсцесс от флегмоны?
- 501 Что позволяет установить поверхностная пальпация живота?
- 502 Что понимают под термином «симптом»?
- 503 Что понимают под термином «синдром»?
- 504 Что правильно характеризует сепсис?
- 505 Что представляет собой гинекомастия?
- 506 Что следует подозревать, если кожа ареолы и соска покрыты эрозиями и корками со скудным отделяемым?
- 507 Что соответствует наличию синдрома системного воспалительного ответа (SIRS)?
- 508 Что соответствует наличию синдрома системного воспалительного ответа (SIRS)?

- 509 Что такое тризм, возникающий при столбняке?
- 510 Что характеризует висцеральную боль при «остром животе»?
- 511 Что характеризует соматическую боль при «остром животе»?
- 512 Что характеризует тампонаду сердца?
- 513 Что является возбудителем фурункула и карбункула?
- 514 Чувство тяжести в нижних конечностях (симптом «тяжелых ног»), возникающее в вертикальном положении и исчезающее после ночного отдыха, характерно для:
- 515 Шина Дитерихса / О'Хары используется для:
- 516 Шкала Глазго используется для определения:
- 517 Эпигастральная область живота включает:
- 518 Эффективными методами улучшения кровоснабжения конечности при ишемической форме диабетической стопы являются:
- 519 Язвы стопы развиваются у: